

# Fiche Technique

## Chicorée frisée 'de Namur'

Cette variété semble avoir connu un début de commercialisation dans les années 1930. Dans les documents consultés, elle apparaît pour la première fois dans le catalogue du semencier Malinois Graineterie hollandaise de 1934 sous le nom de 'Grosse de Namur' et avec la courte description « *Foncé à Cœur très plein. Belle variété<sup>1</sup>* »

### CARTE D'IDENTITE

**Famille :** Asteraceae  
**Genre :** Cichorium  
**Espèce :** Endivia var. Crispum (Lam.)  
**Variété :** 'de Namur'  
**Synonymes :** 'Fine de Namur', 'Grosse de Namur', 'de Namur, race Maes'  
**Origine :**  
**Origine de l'accession :**  
**Mainteneur / Commercialisation :**  
**Inscription au catalogue :** -

### HISTORIQUE : PATRIMOINE

La chicorée frisée 'de Namur' fut probablement sélectionnée dans les années 1920 par les maraîchers de la région namuroise qui étaient encore nombreux à une époque où la spéculation immobilière n'avait pas encore détruit la ceinture maraîchère de la ville.

Cette variété traditionnelle cultivée nous revient aujourd'hui, grâce au projet Biodomestica Nord-Pas-de-Calais - Wallonie et au travail de Laurent Minet du CTH de Gembloux, qui a pu retrouver une accession de cette variété. Lors d'une rencontre en mars 2015, quelques jardiniers de Nature & Progrès actifs au sein de la Maison de semences ont reçu des graines ainsi que des plans porte-graines afin d'en tester les mérites.

Pour la chicorée frisée, la « montée à graines » a sans doute été une des grandes difficultés à surmonter par les sélectionneurs et le semencier français Clause utilisera cette frisée 'de Namur' pour l'amélioration de sa gamme : « [...] Par ailleurs la quatrième gamme exige un approvisionnement aussi régulier que possible tout au long de l'année. La difficulté principale est la « montée à graines » estivale rendant le

produit inutilisable. Les premières obtentions modernes palliant ce défaut ont été offertes par les Etablissement Clause. Elles sont probablement issues de la vieille variété « Namur » réputée pour sa résistance à la montée en graines, ce qui souligne l'intérêt des collections de ressources génétiques. Mais, revers de la médaille, cette qualité n'a pas été sans poser quelques problèmes aux agriculteurs multiplicateurs de semences ... » (PITRAT & FOURY, 2003, 242-243).

### A propos de l'endive frisée de Namur.

Depuis quelques années, les maraîchers des environs de Namur, cultivent une chicorée-endive dénommée "Frisée de Namur". Pour que ces maraîchers la cultivent de préférence à toute autre, c'est qu'elle présente de réels mérites qu'il est de mon devoir de signaler à votre attention. En effet, les années chaudes et sèches, l'endive monte très vite en graines ; l'été dernier nous a donné l'occasion de constater la chose.

Cette montée prématurée est supprimée en très grande partie en cultivant cette variété appelée à rendre de très grand services aux maraîchers tout particulièrement. Durant l'été dernier, sec et chaud, j'ai eu l'heureuse occasion de visiter de très grands carrés de cette variété dans lesquels aucune endive n'était montée. C'est une acquisition précieuse qui ne pourra que se confirmer par l'essai à tenter et que je recommande. Des amis, des particuliers cette fois, en ont fait l'essai ; tous ont obtenu des spécimens vraiment d'exposition, alors que les années précédentes les autres variétés ne les satisfaisaient nullement.

A. Chatelain,  
Conseiller d'Horticulture

Chicorée 'Frisée de Namur' - Le Bulletin horticole, 15-04-1935, 128.

### CARACTERISATIONS

#### Description dans la littérature

Sous divers noms, on trouve quelques descriptions, parfois des plus succinctes, dans quelques autres ouvrages :

GRAINETERIE HOLLANDAISE, 1934, 14 : « Rustique ».

Gonthier, 1954, 44 : « Frisée de Namur. Excellente variété d'été. Monte très lentement ».

YERNAUX, 1955, 9 : « Fine de Namur. Extra pour maraîchers ».

<sup>1</sup> Graineterie hollandaise, Malines, 1934, 14.

SOMERS, 1961, 6 : « Variété maraîchère, très épaisse, à feuillage frisé, qui monte difficilement en graines ».

LEFEBVRE-PERNET, 1990, 8 : « Fine de Namur, race Maes ».

L'ensemble de ces informations somme toute assez maigres permet de caractériser la Chicorée 'Frisée de Namur' comme une variété d'été et d'automne fournissant une pomme volumineuse à cœur plein au feuillage frisé et vert foncé, adaptée aux étés secs, résistante à la montaison et rustique.

#### Illustrations




Tableau UPOV

N°	CRITERES	
	<b>PLANTE</b> : pour les caractères 1 à 4, les observations doivent être effectuées juste avant la maturité de récolte.	
1	Diamètre	5 moyen
2	Port	3 dressé
3	Forme de la partie sup. en sect. longitudinale	3 ellip. étroite transv.
	<b>CŒUR</b> -----	
4	Tendance au blanchissement	
-	Couleur	2 vert
-	Intensité couleur verte	5 moyenne
-	Forme du sommet en sect. longitudinale	5 faiblement déprimé
	<b>FEUILLE</b> : pour les caractères 5 à 20, les observations doivent être réalisées juste avant la maturité de récolte sur des feuilles qui ne sont pas des feuilles enveloppantes ou intérieures.	

-	Port	5 demi-dressé
5	Courbure de la partie sup.	5 moyenne
6	Longueur	5 moyenne
8	Largeur maximale	5 moyenne
10	Couleur	2 verte
-	Intensité de la couleur	7 foncée
12	Nervation	
13	Longueur des lobes	
15	Longueur de la denture du bord	
18	Rapport longueur sans lobe / L. totale	
19	Largeur de la nervure médiane	
20	Pigmentation anthocyane	
	<b>HAMPE FLORALE</b> : pour les caractères 21 à 24, les observations doivent être effectuées sur une tige en floraison.	
21	Hauteur	5 moyenne
22	Fasciation	9 présente
23	Port des ramifications	1 dressé
	<b>FLEUR</b> : pour le caractère 25, la couleur doit être observée sur des fleurs à peine ouvertes car elle change avec leur vieillissement.	
25	Couleur	4 bleu violacé
	<b>CARACT. PHYSIOLOGIQUES</b> -----	
26	Epoque de maturité de récolte	7 tardive
27	Epoque de montaison	9 très tardive



La frisée 'de Namur' s'est particulièrement bien comportée lors des longues périodes de sécheresse qui ont sévi en 2017. Aucune n'est montée en semence mais son petit défaut s'est révélé avec l'apparition de petites nécroses marginales.

Fiche réalisée en collaboration avec les acteurs suivants dans le cadre du projet « Réseau Meuse-Rhin-Moselle »



<https://reseaurmrmsemences.com>